


# Rýma

Zpracováno na základě postupu PharmDr. Píšové

## Doporučený postup České lékárnické komory



### Náměty pro komunikaci s pacientem

<b>Dekongestivní kapky</b> -nepoužívat déle než týden -opakovat lze po několikadenním přerušení terapie -KI: závažná hypertenze, ICHS, zvýš. činnost štítné žlázy, DM, léčba IMAO, glaukom-dle dohody s lékařem, těhotenství a kojení-krátkodobě, jen některé přípr. dále viz DP <b>Alergie a Nachlazení</b>	<b>Kombinace PAR nebo IBU s dekonjestivy</b> <b>PAR</b> - ne u jater. poškoz. <b>IBU</b> - ne při žal.vředech, !alergie <b>fenylefrin</b> + <b>pseudoefedrin</b> -poz.doping.test -ost.KI - viz kapky dále viz DP <b>Alergie a Nachlazení</b>	<b>Rostlinný perorální přípravek</b> (kapky nebo tbl.) -kapky obsahují alkohol	<b>Lokální ATB</b> -nepoužívat déle než 10 dní - ne pro děti do 30 měs. - aroma	<b>Antihistaminika</b> zcela výjimečně ospalost (opatrně po 1.dávce)	<b>Kapky a masti s rostlin. silicemi a vitamíny</b> - ne u alergiků a astmatiků - zpravidla ne u dětí do 1-2 let	<b>Mořské a luhač.vody:</b> -luhač.voda-možnost opětovného naplnění dávkovače, mořské vody s hnacím plynem-velký objem 1střiku (! Kojenci a malé děti)
---	--	---	--	---	--	---