



Příloha doporučeného postupu Úprava, podávání, stabilita a uchování injekčních a infuzních léčivých přípravků.

## DICYNONE

<b><u>léčivá látka:</u></b>	etamsylát
<b><u>obsah balení:</u></b>	čirý až slabě nažloutlý roztok, 250 mg etamsylátu v jedné ampuli (2 ml)
<b><u>rozpuštění:</u></b>	---
<b><u>ředění:</u></b>	---
<b><u>rychlost podání:</u></b>	<u>i.m. aplikace:</u> bolus <u>i.v. inj. aplikace:</u> 1-2 min.
<b><u>Y-site inkompatibilita:</u></b>	není známa
<b><u>stabilita při přípravě u lůžka:</u></b>	originální balení při teplotě 15-25 °C, ampulky chránit před světlem!
<b><u>stabilita při aseptické přípravě:</u></b>	---
<b><u>poznámky:</u></b>	pH 6,0-6,7



Sekce  
nemocničních  
lékárníků  
ČFS ČLS JEP



Česká lékárnická  
komora



ČESKÁ SPOLEČNOST  
INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Příloha doporučeného postupu Úprava, podávání, stabilita a uchovávání injekčních a infuzních léčivých přípravků.

### tekutinová restrikce

**ředění:** neředěný

**rychlost podání:** 1-2 min.

### pediatrická populace

**rozpouštění:** ---

**vytěšňovací objem:** ---

**konečný objem:** ---

**výsledná  
koncentrace:** 125 mg/ml

### zdroje

- 1) Souhrn údajů o přípravku DICYNONE 250, datum revize textu 27. 5. 2015, přes [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz), hledáno 18. 10. 2015.
- 2) Monografie **etamsylate**, přes Lexicomp Online® , Martindale: The Complete Drug Reference®, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc.; hledáno 16. 11. 2014.